



## ***Giáo Dục Bệnh Nhân***

### ***Dịch Vụ Rọi Hình***



# Thuốc Metformin và Chụp Bằng CT Của Quý Vị

**Metformin là một loại thuốc không nên dùng vào ngày chụp CT hoặc thực hiện thủ thuật nào có dùng thuốc cản quang bằng chất iodine.**

**Xin nói với bác sĩ của quý vị xem quý vị có được ngưng dùng loại thuốc này vào ngày thử nghiệm của quý vị hay không.**

**Nếu quý vị ngưng dùng thuốc có chất metformin, xin bắt đầu dùng lại thuốc này 48 giờ sau kỳ thử nghiệm của quý vị.**

Nếu bác sĩ của quý vị cho phép, nên ngưng những thuốc nào có chất metformin vào ngày quý vị chụp CT hoặc thực hiện thủ thuật có dùng chất cản quang bằng iodine (thuốc màu bức xạ). Loại cản quang này, được dùng trong tĩnh mạch, có thể ảnh hưởng đến thận của quý vị và đến cách cơ thể của quý vị loại bỏ chất metformin ra khỏi cơ thể quý vị. Các thuốc thông thường có chứa metformin bao gồm:

- Glucophage
- Glucophage-XR
- Glucovance

Xin hỏi bác sĩ của quý vị xem quý vị có được ngưng dùng thuốc có chứa chất metformin vào ngày rọi hình hoặc làm thủ thuật của quý vị hay không. Ngoài ra, cũng nên hỏi bác sĩ của quý vị xem quý vị có nên khám kiểm tra chức năng thận của mình trước khi quý vị bắt đầu dùng lại thuốc có chất metformin hay không.

Xin ngưng dùng thuốc có chất metformin vào ngày quý vị rọi hình hoặc có thực hiện thủ thuật nào sẽ dùng chất cản quang. Xin dùng lại thuốc của quý vị 48 giờ sau khi quý vị rọi hình hoặc có thực hiện thủ thuật.

## **Có thắc mắc?**

Các thắc mắc của quý vị đều quan trọng. Xin gọi cho bác sĩ của quý vị hoặc nơi chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan tâm.

Dịch Vụ Rọi Hình: 206-598-6200

UNIVERSITY OF WASHINGTON  
**MEDICAL CENTER**  
UW Medicine

Imaging Services  
Box 357115

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195  
206-598-6200

© University of Washington Medical Center  
Metformin and Your CT Scan  
Vietnamese

11/2005 Rev. 12/2006  
Reprints: Health Online



# Metformin and Your CT Scan

**Metformin is a medicine that should not be taken on the day of a CT scan or procedure where iodine contrast dye is used.**

**Talk to your doctor about whether it is OK for you to stop taking this type of medicine on the day of your test.**

**If you stop taking medicine with metformin in it, start taking it again 48 hours after your test.**

If your doctor allows, medications that contain metformin should be stopped on the day you have a CT scan or procedure that requires the use of iodine contrast material (radiology dye). This type of contrast, which is used in the veins, may affect your kidneys and how your body clears metformin from your system. Common medicines that contain metformin include:

- Glucophage
- Glucophage-XR
- Glucovance

Check with your doctor about whether it is OK for you to stop taking medicine that contains metformin on the day of your scan or procedure. Also, ask your health care provider if you should have your kidney function checked before you restart your metformin medication.

Stop taking medicine that contains metformin on the day of your scan or procedure where contrast will be used. Restart your medicine 48 hours after your scan or procedure.

UNIVERSITY OF WASHINGTON  
**MEDICAL CENTER**  
UW Medicine

**Imaging Services**

Box 357115

1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195

206-598-6200

## Questions?

Your questions are important. Call your doctor or health care provider if you have questions or concerns.

Imaging Services: 206-598-6200